Dijon le 8. 9bre 1777

Monsieur

j'ai l'honneur de vous envoyer la notice d'une operation qui a été faite au sujet d'une tumeur carcinomateuse de l'oeil. quoique l'extirpation ait été sans succès, j'ai cru cependant que l'exposition des circonstances particulières a ce cas pourroit vous interesser. je conserve dans une preparation d'eau de vie la tumeur extirpée et si l'inspection pouvoit vous etre utile, je vous prie de me le faire sçavoir, je vous l'envoirrais avec empressement.

Daignés agréer les assurances de mon sincere Respect,

Monsieur

Votre très humble et tres obeissant serviteur

Chaussier

ARC 52 n° 50

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dans Le courant de juin de cette année on amena de La campagne a L'hopital de cette ville un enfant agé d'environ 8 ans et demi, qui portoit dans L'orbite droite une tumeur de La grosseur d'un petit oeuf; Les parents nous apprirent que six a sept mois auparavant cet enfant avoit Recu sur La cornée un coup qui avoit produit un gonflement tres considerable et tres douloureux suivi enfin suivi de La fonte de L'oeil, que depuis ce temps Le Restant du globe avoit formé une tumeur qui par degrés etoit parvenue au volume ou nous La voijons.

on ne Reconnoissoit aucun vestige des Membranes de L'oeil, La tumeur etoit dure, sarcomateuse, sa surface etoit inegale, anfractueuse, ulcerées, D'un Rouge foncé prés Les paupieres, et plus exterieurement encroutée D'une mucosité noiratre, fetide, et desséchée dans certains endroits. De temps en temps elle Rendoit un sang brunâtre et gluant surtout Lors quon L'avoit touché. Les paupieres n'etoient pas etendues sur La tumeur, mais elles etoient Renversées en arriere, de facon que cette masse sarcomateuse avoit La forme d'un choux fleur dont Le pedicule plus Resserré et en quelque sorte etranglé par Les paupieres, paroissoit fixé dans L'orbite. L'enfant conservoit d'ailleurs ses forces, son appetit et meme son embonpoint. Le sommeil n'etoit que peu troublé. Malgré La bride que formoient Les paupieres il falloit que La tumeur n'etoit point du tout adherente aux parois de L'orbite; car on pouvoit facilement L'allonger en La tirant en avant [illegible] Tel etoit L'etat De Lenfant Lors quon Le conduisit a L'hopital.

Cette tumeur fut unanimement Decidée Cancereuse et L'extirpation fut Regardée comme le seul moyen curatif: en consequence le 28 du meme mois L'operation fut executée conformement au manuel que vous avés prescrit: comme les paupieres formoient une forte D'etranglement au tour de la tumeur, j'aurois Desiré que L'on commenca L'operation par une section transversale de la commis-sure externe des paupieres; section qui me paroissoit essentielle, pour Mieux Relever les paupieres, pour faire plus facilement et plus profondement la tumeur sans trop la comprimer et sans tirailler et allonger le nerf optique. enfin pour donner plus de jeu au Bistouri et permettre de detacher la tumeur, la glande Lachrimale, et le tissu graisseux, plus prés des parois osseuses de L'orbite; Mais le chirurgien chargé particulierement du soin du malade Crut cette precaution inutile, et il Resulta de là que le Manuel de L'operation fut un peu long.

il arriva encore dans le cours De L'operation une circonstance qui me parait interessante. La tumeur n'etoit point un fongus solide Mais elle etoit formée par Lepaisissement et La Degenerescence des Membranes de L'oeil, de sorte qu'il Restoit dans le milieu une cavité qui contenoit un fluide. aussi dans le cours De L'extirpation, La tumeur se Rompit, La partie anterieure se detacha entierement en forme de calotte et donna issue a une Liqueur glutineuse et Legerement brunâtre, autant que nous pûmes en juger.

il me paroit que la tumeur avoit été extirpée bien complettement. on voyoit a sa partie posterieure une portion du nerf optique de 5 lignes de longueur, le nerf etoit blanc ; mais cependant un peu alteré et un peu plus gros qu'a l'ordinaire ; la membrane qui lui sert de guaine paroissoit plus dure, plus epaisse, mais la substance medullaire etoit plus molle et comme dissoute ; en pressant le cordon nerveux on voyoit sortir par la surface de la section, une liqueur blanche, epaisse comme du pus et qui sembloit exuder des differentes fibrilles dont le nerf est composé : de meme qu'en pressant la substance tubulée du rein on voit sortir l'urine des differents pores dont le mamelon est formé. cette alteration du nerf optique me fit mal augurer des suites de l'operation, et je craignis des lors que le vice ne se fut propagé jusqu'au cerveau.

La cavité qui renfermoit le fluide qui s'etoit ecoulé pendant l'operation, presentoit une surface lisse, encroutée d'une membrane fongueuse, grisatre, et hérissée de quelques petites eminences rougeatres en forme de crêtes.

Apres l'operation le malade fut pansé simplement avec de la charpie seche que l'on eleva par gradation de maniere a ne pas comprimer les paupieres. il n'y eut ni hemmorhagie ni aucun accident qui merite la peine d'etre rapporté. la fievre, le gonflement qui etoient survenus les premiers jours se dissiperent par degrés, la suppuration devint louable